

『海外生活における健康管理』（第3版） 正誤表

平素は格別のお引き立て誠にありがとうございます。  
 本書下記ページにおきまして誤った記載箇所がございました。  
 深くお詫びし、訂正をさせていただきます。

恐れ入りますが、本正誤表をご確認の上、ご利用いただけますようお願いいたします。

ページ	訂正箇所	修正前	修正後
目次 2.予防接種	5. 海外赴任に際し必要な予防接種（小児・成人）	18) ダニ媒介性脳炎	18) ダニ媒介脳炎
目次 2.予防接種	6. 国内未承認輸入ワクチンの接種方法	9) ダニ媒介性脳炎ワクチン	9) ダニ媒介脳炎ワクチン
11	表2-2の一番下	肺炎球菌（PPCV23）	肺炎球菌（PPSV23）
11	表2-2の欄外 左4行目	DTa <sub>g</sub>	DTaP
26	18) のタイトル	18) ダニ媒介性脳炎	18) ダニ媒介脳炎
29	表2-11		最新版添付
35	9) のタイトル	9) ダニ媒介性脳炎ワクチン	9) ダニ媒介脳炎ワクチン
35	表2-22のタイトル	ダニ媒介性脳炎ワクチンの接種スケジュール	ダニ媒介脳炎ワクチンの接種スケジュール
103	11) MERS 3行目	継続的に報告され <u>た</u> ています。	継続的に報告されています。

表2-11 予防接種一覧

ワクチン名	ワクチンの種類	接種可能年齢	基礎免疫:接種回数、完了期間	抗体陽性率	有効期間	重篤な副反応、補足	
黄熱	生ワクチン	9 ヶ月	1 回接種	ほぼ100%	10日後～10年**	4 ヶ月以下の者では脳炎	
コレラ(経口不活化) WC/rCTB*	死菌トキソイド混合(経口)	2～5歳 6歳以上	3回①1週②1週③2週 2回=①(1～6週)②	有効率85～100%	5年	特に報告はない	
狂犬病	不活化ワクチン	全年齢	3回、6月～12月	ほぼ100%	3回接種後～6から18 ヶ月	特に報告はない	
麻しん 風しん おたふくかぜ MR MMR*	生ワクチン 生ワクチン 生ワクチン 生ワクチン混合 生ワクチン混合	12 ヶ月 12 ヶ月 12 ヶ月 12 ヶ月 12 ヶ月	2回接種(1～2歳、5～7歳) 2回接種(1～2歳、5～7歳) 1回接種 2回接種(1～2歳、5～7歳) 2回接種(国内では中止)	95%以上 95%以上 90%以上	10日後～10年以上 4週後～10年以上 2から3週後～数年以上	脳炎、SSPE(亜急性硬化性全脳炎) 特に報告はない 無菌性髄膜炎 麻疹・風疹に準ずる 無菌性髄膜炎、1993年4月中止***	
水痘	生ワクチン	12 ヶ月	2回接種(12～15カ月、18～23カ月)	95%以上	数日～10年以上	帯状疱疹	
日本脳炎	不活化ワクチン	6 ヶ月	3回、1年	80～90%	接種後2週間～1から4年	急性散在性脳脊髄炎(疑い)	
ポリオ経口生(OPV) Salkワクチン(IPV)	生ワクチン(経口) 不活化ワクチン	3 ヶ月 2 ヶ月	2回、6月 4回、1年6月	80%以上 ほぼ100%	接種後4週～数年 4回目接種後～5年以上	弛緩性麻痺 特に報告はない	
A型肝炎 ヒト免疫グロブリン	不活化ワクチン ヒト免疫グロブリン	全年齢 全年齢	3回、6月 3 ヶ月毎に1回	ほぼ100% 約85%	接種後1 ヶ月～5年以上 投与直後～3 ヶ月未満	特に報告はない、1歳以上の接種推奨 特に報告はない	
B型肝炎	血漿由来/遺伝子組み替え	2 ヶ月	3回、6月	70～90%	接種後2 ヶ月～5年以上	特に報告はない	
腸チフス	Ty21a* ViCPS*	生ワクチン(経口) 多糖体ワクチン	6歳 2歳	4回、6日 1回	有効率50～80%	最終接種～5年 2週後～3年以上	特に報告はない、2～8℃で保存 特に報告はない
BCG	生ワクチン(皮内)	1歳未満	1回	有効率50%以上	2 ヶ月後～10年以上	腋下リンパ節腫脹、局所の潰瘍	
ジフテリア(D) 百日咳(P) 破傷風(T) DPT-IPV	トキソイド 不活化ワクチン トキソイド トキソイド+不活化混合	3 ヶ月 3 ヶ月 3 ヶ月 3 ヶ月	4回 4回 4回 4回	} 1年6月 70～90% 有効率90%以上 ほぼ100%	2回接種後～約10年間 2回接種後～6から12 ヶ月 2回接種後～5年以上	特に報告はない 特に報告はない 特に報告はない 特に報告はない	
インフルエンザ	不活化ワクチン	6 ヶ月	2回(13歳以上1回)、4週		有効率70%	2回接種後1週～1年	ギランバレー症候群
髄膜炎菌 メナクトラ(MCV4)	コンジュゲートワクチン	2歳～55歳	1回		90%	3～5年	特に報告はない(ギランバレー症候群既往者に注意)
メンセバックス MPSV*	ポリサッカライドワクチン	2歳	1回		90%	5年	特に報告はない
インフルエンザb菌	結合型ワクチン	2 ヶ月	4回、1年6月	80%	3～4回接種後～約1年間	特に報告はない	
肺炎球菌(PPSV23)	ポリサッカライドワクチン	2歳	1回	73～100%	5年以上	特に報告はない、2歳未満は避ける	
肺炎球菌(PCV13)	コンジュゲートワクチン	2カ月	4回、1年3月	90%	5年以上	特に報告はない	
ダニ媒介性脳炎*	不活化ワクチン	1歳	3回、3週	ほぼ100%	初回接種後～1年	特に報告はない	

\* : 未承認、個人輸入により接種可能な医療機関あり

\*\* : 2016年7月11日から有効期限が永年。既に取得済の証明書(期限切の証明書を含む。)については7月11日から自動的に有効期限が永年。更新手続不要。

\*\*\* : 国内では、1989年4月～1993年3月迄定期接種。